

## DIFURE<sup>®</sup> PRO

### Faut-il encore effectuer un traitement fongicide en betteraves ?

La sécheresse de cette année n'a pas permis aux betteraves de commencer leur grosse augmentation de rendement avant le retour des pluies de mi-août.

De plus, conséquence de la sécheresse, la masse foliaire de vos betteraves est souvent très faible.

Il est donc d'autant plus important de ne pas laisser les maladies s'y développer.

Avec le retour des pluies, les maladies reprennent rapidement leur développement.

En fonction de la date de votre traitement précédent, il est temps d'aller observer vos parcelles, en particulier les nouvelles feuilles non protégées, et d'effectuer un traitement si nécessaire.

## DIFURE<sup>®</sup> PRO

2 applications/culture

Délai avant récolte très court : **21 jours**

## PROZEB<sup>®</sup> EXTRA 75 WG

3 applications/culture

Délai avant récolte court : **28 jours**

### Nos conseils :

**Difure Pro 0,6 l/ha + Prozeb Extra 75WG 2 kg/ha**

(seuil ré-atteint, arrachage tardif, variétés sensibles,...)



[www.protexnv.be](http://www.protexnv.be)

UTILISEZ LES PRODUITS DE PROTECTION DES CULTURES EN TOUTE SÉCURITÉ.  
Lisez attentivement l'étiquette avec les informations sur le produit avant utilisation.  
Assurez-vous de ne pas contaminer l'eau avec le produit ou son emballage.